

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34
BARRIO BARZAL

Nombre	HIGUERA ACOSTA LAURA CA...	Muestra	10070419	Estado	Final
ID del paciente	1121941977	Origen	Orina	F. Estado	1/23/2020
F. Nacimiento		Servicio		F. Muestra	

1 Staphylococcus aureus Estado: Final 1/23/2020

1 S. aureus

Antimicrobiano	CIM	Interps
Amox/A Clav	>4/2	R
Amp/Sulbactam	16/8	R
Ampicilina	>8	R
Cefazolina	>16	R
Ciprofloxacina	>2	R
Clindamicina	>4	
Daptomicina	<=0.5	S
Eritromicina	>4	
Gentamicina	>8	R
Levofloxacina	<=1	S
Linezolid	<=1	S
Moxifloxacina	4	
Nitrofurantoina	<=32	S
Oxacilina	>2	R
Penicilina	>8	R
Rifampicina	<=1	S
Screening de Cefoxitina	<=4	NEG
Synercid	<=1	S
Tetraciclina	>8	R
Trimet/Sulfa	>2/38	R
Vancomicina	<=0.25	S

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.