

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4  
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34  
BARRIO BARZAL

Nombre	<b>QUESADA CASTELLANOS, JO...</b>	Muestra	<b>10134093</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	1234788583	Origen	Pierna	F. Estado	08-Oct-22
F. Nacimiento	16-Sep-97	Servicio	c.ext	F. Muestra	06-Oct-22

**1 Klebsiella pneumoniae** Estado: Final 08-Oct-22

**1 K. pneumoniae**

Antimicrobiano	CIM	Interps
Amicacina	>32	R
Amp/Sulbactam	>16/8	R
Aztreonam	>16	R
Cefazolina	>4	R
Cefepima	<=2	S
Cefotaxima	<=1	S
Cefoxitina	>16	R
Ceftazidima	<=1	S
Cefuroxima	>16	R
Ciprofloxacina	>2	R
Colistina	<=2	I
Ertapenem	<=0.5	S
Gentamicina	>8	R
Imipenem	<=1	S
Levofloxacina	>4	R
Meropenem	<=1	S
Pip/Tazo	>64	R
Tetraciclina	>8	R
Ticar/A Clav	>64	R
Tobramicina	<=4	S
Trimet/Sulfa	>2/38	R

S = Sensible N/R = No Informado Blanco = Dato no disponible, o antimicrobiano no probado  
 I = Intermedio --- = No probado ESBL = Betalactamasa de amplio espectro  
 R = Resistente POS = Positivo Blac = Betalactamasa positiva  
 MIC = mcg/ml (mg/L) NEG = Negativo TFG = Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
 R\* = Interpretación predictiva resistente  
 EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.  
 IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.