

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|
| Nombre | LOZANO LADINO GENY PAOLA | Muestra | 11064592 | Estado | Final |
| ID del paciente | 1122135629 | Origen | Orina | F. Estado | 15-Jul-20 |
| F. Nacimiento | | Servicio | | F. Muestra | |

1 Klebsiella aerogenes Estado: Final 15-Jul-20

1 K. aerogenes

| Antimicrobiano | CIM | Interps |
|------------------|--------|---------|
| Ácido Nalidíxico | >16 | R |
| Amicacina | <=16 | S |
| Amox/A Clav | >16/8 | R |
| Amp/Sulbactam | <=8/4 | R |
| Cefalotina | >16 | R |
| Cefepima | <=1 | S |
| Cefoxitina | >16 | R |
| Cefuroxima | 16 | R |
| Ciprofloxacina | <=1 | S |
| Colistina | <=2 | S |
| Ertapenem | <=0.5 | S |
| Fosfomicina | <=64 | N/R |
| Gentamicina | >8 | R |
| Imipenem | <=1 | S |
| Levofloxacina | <=2 | S |
| Meropenem | <=1 | S |
| Nitrofurantoina | >64 | R |
| Norfloxacina | 8 | I |
| Pip/Tazo | <=16 | S |
| Tobramicina | <=4 | S |
| Trimet/Sulfa | <=2/38 | S |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|-----|---|--------------|--------|---|---|
| S | = | Sensible | N/R | = | No Informado | Blanco | = | Dato no disponible, o antimicrobiano no probado |
| I | = | Intermedio | --- | = | No probado | ESBL | = | Betalactamasa de amplio espectro |
| R | = | Resistente | POS | = | Positivo | Blac | = | Betalactamasa positiva |
| MIC | = | mcg/ml (mg/L) | NEG | = | Negativo | TFG | = | Cepa timidin dependiente |

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.