

Nombre	GUTIERREZ, CRUZ MARCO	Muestra	11110972	Estado	Final
ID del paciente	17316664	Origen	Orina	F. Estado	19-Jan-22
F. Nacimiento	21-Jan-55	Servicio	c.ext	F. Muestra	17-Jan-22

Observaciones de la muestraMonitorear clínicamente al paciente con Ciprofloxacina ≤ 1 y Levofloxacina ≤ 2 **1 Pseudomonas aeruginosa**

Estado: Final

19-Jan-22

Rto. Colonias: 100.000 UFC/ ml

1 P. aeruginosa

Antimicrobiano	CIM	Interps
Amicacina	≤ 16	S
Aztreonam	8	S
Cefepima	4	S
Ceftazidima	≤ 1	S
Ciprofloxacina	≤ 1	S
Colistina	≤ 2	I
Gentamicina	≤ 4	S
Imipenem	≤ 1	S
Levofloxacina	≤ 2	S
Meropenem	≤ 1	S
Norfloxacina	≤ 4	S
Pip/Tazo	≤ 16	S
Tobramicina	≤ 4	S

S	= Sensible	N/R	= No Informado	Blanco	= Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	= Intermedio	---	= No probado	ESBL	= Betalactamasa de amplio espectro
R	= Resistente	POS	= Positivo	Blac	= Betalactamasa positiva
MIC	= mcg/ml (mg/L)	NEG	= Negativo	TFG	= Cepa timidin dependiente

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente

EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.