

Nombre	<b>LLANOS BOLAÑOS, CINDY JH...</b>	Muestra	<b>11120564</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	1088265048	Origen	Orina	F. Estado	25-May-22
F. Nacimiento	25-Jan-89	Servicio	c.ext	F. Muestra	23-May-22

**1 Klebsiella aerogenes**

Estado: Final

25-May-22

Texto libre del aislamiento

NITROFURANTOINA RESISTENTE

Monitorear clínicamente al paciente con

Ciprofloxacina &lt;=1 y Levofloxacina &lt;=2

**1 K. aerogenes**

<u>Antimicrobiano</u>	<u>CIM</u>	<u>Interps</u>
Ácido Nalidixico	<=16	S
Amicacina	<=16	S
Amp/Sulbactam	>16/8	R
Cefepima	<=2	S
Cefoxitina	>16	R
Cefuroxima	>16	R
Ciprofloxacina	<=1	S
Colistina	<=2	I
Ertapenem	<=0.5	S
Gentamicina	<=4	S
Imipenem	<=1	S
Levofloxacina	<=2	S
Meropenem	<=1	S
Tetraciclina	<=4	S
Ticar/A Clav	<=16	S
Tobramicina	>8	R
Trimet/Sulfa	<=2/38	S

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente

EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.