

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|
| Nombre | GUERRERO MORENO, GUSTA... | Muestra | 11189523 | Estado | Final |
| ID del paciente | 19410595 | Origen | Orina | F. Estado | 04-Oct-24 |
| F. Nacimiento | 19-Apr-60 | Servicio | c.ext | F. Muestra | 02-Oct-24 |

Observaciones de la muestra

Monitorear clínicamente al paciente con Ciprofloxacina <=1 y Levofloxacina <=2

1 Pseudomonas aeruginosa

Estado: Final

04-Oct-24

1 P. aeruginosa

| <u>Antimicrobiano</u> | <u>CIM</u> | <u>Interps</u> |
|-----------------------|------------|----------------|
| Amicacina | <=8 | S |
| Aztreonam | <=4 | S |
| Cefepima | <=2 | S |
| Ceftazidima | <=1 | S |
| Ciprofloxacina | <=0.06 | S |
| Imipenem | <=1 | S |
| Levofloxacina | <=0.5 | S |
| Meropenem | <=0.5 | S |
| Pip/Tazo | <=16 | S |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|-----|---|--------------|--------|---|---|
| S | = | Sensible | N/R | = | No Informado | Blanco | = | Dato no disponible, o antimicrobiano no probado |
| I | = | Intermedio | --- | = | No probado | ESBL | = | Betalactamasa de amplio espectro |
| R | = | Resistente | POS | = | Positivo | Blac | = | Betalactamasa positiva |
| MIC | = | mcg/ml (mg/L) | NEG | = | Negativo | TFG | = | Cepa timidin dependiente |

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente

EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.