

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4  
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34  
BARRIO BARZAL

Nombre	<b>GIRALDO SUAREZ GRACILIANO</b>	Muestra	<b>12069497</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	15361770	Origen	Orina	F. Estado	07-Nov-20
F. Nacimiento		Servicio		F. Muestra	05-Nov-20

**1 Klebsiella pneumoniae ESBL** Estado: Final 07-Nov-20

**1 K. pneum ESBL**

Antimicrobiano	CIM	Interps
Amicacina	>32	R
Ampicilina	>16	R*
Aztreonam	>8	ESBL
Cefalotina	<=8	R*
Cefepima	>8	R*
Cefotaxima	<=1	R*
Cefoxitina	<=8	S
Ceftazidima	8	ESBL
Cefuroxima	<=8	R*
Ciprofloxacina	<=1	S
Colistina	>4	R
Ertapenem	<=0.5	S
Fosfomicina	<=64	S
Gentamicina	8	I
Imipenem	<=1	S
Levofloxacina	<=2	S
Meropenem	<=1	S
Nitrofurantoina	<=32	S
Norfloxacina	<=4	S
Pip/Tazo	<=16	S
Tobramicina	<=4	S
Trimet/Sulfa	<=2/38	S

S = Sensible	N/R = No Informado	Blanco = Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I = Intermedio	--- = No probado	ESBL = Betalactamasa de amplio espectro
R = Resistente	POS = Positivo	Blac = Betalactamasa positiva
MIC = mcg/ml (mg/L)	NEG = Negativo	TFG = Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente  
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.  
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.