

Nombre	<b>ORTEGA CORTES, FLOR MARIA</b>	Muestra	<b>12161317</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	28820856	Origen	Orina	F. Estado	22-Dec-23
F. Nacimiento	14-Aug-65	Servicio	c.ext	F. Muestra	20-Dec-23

### Observaciones de la muestra

«Pip/tazo MIC <=16 cubre la categoría Sensible Dosis Dependiente y Sensible. Implica una dosis de 4.5 q/6 h en infusión de 3 h»

**1 Proteus mirabilis** Estado: Final 22-Dec-23  
>100.000 UFC/ml

### 1 P. mirabilis

<u>Antimicrobiano</u>	<u>CIM</u>	<u>Interps</u>
Amicacina	<=8	S
Amox/A Clav	<=8/4	S
Amp/Sulbactam	<=8/4	S
Ampicilina	>16	R
Aztreonam	<=4	S
Cefazolina	<=2	S
Cefepima	<=2	S
Cefoxitina	<=8	S
Ceftazidima	<=1	S
Ceftriaxona	<=1	S
Cefuroxima	<=8	S
Ciprofloxacina	0.25	S
Ertapenem	<=0.5	S
Gentamicina	<=4	S
Levofloxacina	1	I
Meropenem	<=0.5	S
Pip/Tazo	<=16	S
Trimet/Sulfa	>4/76	R

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente

EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.