

Nombre	VALENCIA VALENCIA, JOHAN ...	Muestra	12179142	Estado	Final
ID del paciente	1006717446	Origen	Orina	F. Estado	02-Oct-24
F. Nacimiento	13-Feb-03	Servicio	c.ext	F. Muestra	30-Sep-24

### Observaciones de la muestra

Monitorear clínicamente al paciente con Ciprofloxacina  $\leq 1$  y Levofloxacina  $\leq 2$

**1 Proteus mirabilis**

Estado: Final

02-Oct-24

### 1 P. mirabilis

<u>Antimicrobiano</u>	<u>CIM</u>	<u>Interps</u>
Amicacina	$\leq 8$	S
Amox/A Clav	$> 8/4$	N/R
Amp/Sulbactam	$> 16/8$	R
Ampicilina	$> 16$	R
Aztreonam	$\leq 4$	S
Cefazolina	$> 16$	R
Cefepima	$\leq 2$	S
Cefoxitina	$> 8$	R
Ceftazidima	$\leq 1$	S
Ceftriaxona	$\leq 1$	S
Cefuroxima	$> 16$	R
Ciprofloxacina	$\leq 0.06$	S
Ertapenem	$\leq 0.5$	S
Gentamicina	$\leq 4$	S
Levofloxacina	$\leq 0.5$	S
Meropenem	$\leq 0.5$	S
Pip/Tazo	$\leq 16$	S
Trimet/Sulfa	$\leq 2/38$	S

S	= Sensible	N/R	= No Informado	Blanco	= Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	= Intermedio	---	= No probado	ESBL	= Betalactamasa de amplio espectro
R	= Resistente	POS	= Positivo	Blac	= Betalactamasa positiva
MIC	= mcg/ml (mg/L)	NEG	= Negativo	TFG	= Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente

EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.