

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4  
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34  
BARRIO BARZAL

Nombre	<b>METEUS ZAFRA, DIANNE</b>	Muestra	<b>34141987</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	40401570	Origen	Orina	F. Estado	10-Nov-22
F. Nacimiento	20-Jul-73	Servicio	c.ext	F. Muestra	08-Nov-22

**1 Staphylococcus saprophyticus** Estado: Final 10-Nov-22

**1 S. saprophyticus**

Antimicrobiano	CIM	Interps
Amox/A Clav	<=4/2	S*
Amp/Sulbactam	<=8/4	S*
Ampicilina	<=2	R
Cefazolina	<=4	S*
Ciprofloxacina	<=1	S
Clindamicina	<=0.5	
Daptomicina	<=0.5	S
Eritromicina	<=0.5	
Gentamicina	<=4	S
Levofloxacina	<=1	S
Linezolid	<=1	S
Moxifloxacina	<=0.5	
Nitrofurantoina	<=32	S
Oxacilina	0.5	S*
Penicilina	0.12	R
Rifampicina	<=1	S
Synercid	<=1	S
Tetraciclina	>8	R
Trimet/Sulfa	<=0.5/9.5	S
Vancomicina	<=0.25	S

S = Sensible N/R = No Informado Blanco = Dato no disponible, o antimicrobiano no probado  
I = Intermedio --- = No probado ESBL = Betalactamasa de amplio espectro  
R = Resistente POS = Positivo Blac = Betalactamasa positiva  
MIC = mcg/ml (mg/L) NEG = Negativo TFG = Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente  
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.  
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.