

Nombre	DIAZ RODRIGUEZ, RICARDO J...	Muestra	34146906	Estado	Final
ID del paciente	2981905	Origen	Pie	F. Estado	23-Dec-22
F. Nacimiento	07-May-41	Servicio	c.ext	F. Muestra	21-Dec-22

Observaciones de la muestra

SECRECION DE ULCERA MIEMBRO INFERIOR«Pip/tazo MIC <=16 cubre la categoría Sensible Dosis Dependiente y Sensible. Im...

1 Proteus mirabilis

Estado: Final

23-Dec-22

Texto libre del aislamiento

«Pip/tazo MIC<=16Para uso de este medicamento

consultar con Infectología, Comité y/o

PROA». Monitorear clínicamente al paciente con

Cipro<=1 y Levo<=2

1 P. mirabilis

<u>Antimicrobiano</u>	<u>CIM</u>	<u>Interps</u>
Amicacina	<=16	S
Amp/Sulbactam	<=8/4	S
Ampicilina	>16	R
Aztreonam	<=4	S
Cefazolina	4	I
Cefepima	<=2	S
Cefotaxima	<=1	S
Cefoxitina	<=8	S
Ceftazidima	<=1	S
Cefuroxima	16	I
Ciprofloxacina	<=1	S
Ertapenem	<=0.5	S
Gentamicina	<=4	S
Levofloxacina	<=2	S
Meropenem	<=1	S
Pip/Tazo	<=16	S
Tetraciclina	>8	R
Ticar/A Clav	<=16	S
Tobramicina	<=4	S
Trimet/Sulfa	<=2/38	S

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

S* = Interpretación predictiva sensible

R* = Interpretación predictiva resistente

EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.