

Nombre	<b>MEJIA CONTRERAS, JAVIER</b>	Muestra	<b>34170099</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	17340681	Origen	Pie	F. Estado	14-Aug-24
F. Nacimiento	19-Apr-69	Servicio	c.ext	F. Muestra	12-Aug-24

**1 Proteus mirabilis** Estado: Final 14-Aug-24

### 1 P. mirabilis

<u>Antimicrobiano</u>	<u>CIM</u>	<u>Interps</u>
Amicacina	>32	R
Amox/A Clav	>8/4	N/R
Amp/Sulbactam	>16/8	R
Ampicilina	>16	R
Aztreonam	8	I
Cefazolina	>16	R
Cefepima	<=2	S
Cefotaxima	>16	R
Cefoxitina	>8	R
Ceftazidima	<=1	S
Ceftriaxona	>2	R
Cefuroxima	>16	R
Ciprofloxacina	1	R
Ertapenem	<=0.5	S
Gentamicina	>8	R
Levofloxacina	<=0.5	S
Meropenem	<=0.5	S
Pip/Tazo	<=16	S
Trimet/Sulfa	<=2/38	S

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente

EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.